

Clasificarea MGFA	
MGFA I	miastenie oculara
MGFA II	miastenie generalizata usoara
MGFA III	miastenie generalizata moderata
MGFA IV	miastenie generalizata severa
MGFA V	ventilatie mecanica
Subgrupa A:	predomina la brate, picioare
Subgrupa B:	predomina deglutitie, mestecare, vorbire si/sau respiratie

Tratamentul meu actual pentru MG

Piridostigmin: _____

Cortizon: _____

Azatioprin: _____

Mycofenolat Mofetil: _____

Terapii asociate pentru MG: _____

Terapii pentru alte boli: _____

Comentarii: _____

1

URGENTE IN MIASTENIA GRAVIS

Detresa respiratorie acuta

slabiciunea muschilor gatului, deglutitie si tuse slaba, blocarea calor respiratorii cu alimente

Manevra Heimlich: (inconoara pacientul cu ambele brate si comprima brusc in partea de jos a toarcelui creand o suprapresiune care impinge resturile alimentare in sus pe gura)

Pentru medicul de urgenta:

pacientul in decubit lateral
extragerea bolului alimentar cu degetele sau pensa Magill
aspiratie pe pipa Guedel
respiratie artificiala gura la gura sau cu balon Ruben de catre medic

informatii suplimentare in pag 3-5

2

Criza miastenica

agravare lenta sau brusca a respiratiei, deglutitiei, vorbirii, mestecarii, fortei tusei, stare de anxietate

calmarea pacientului

plasare in decubit lateral cu trunchiul mai ridicat

Pentru medicul de urgenta

- neostigmina 0,5 - 1,0 mg i.v/i.m la 3-4 ore cu atropina 0,25ml s.c. sau Nospa ½ fiola i.m.
- intubatie IOT cu intreruperea neostigminei
- plasmafereza si /sau imunoglobuline IV 2g/kg corp in 5 zile
- ajustarea tratamentului imunosupresor
- tratarea cauzei decompensarii MG

Criza colinergica

pupile miotice, lacrimare, transpiratii, spasme musculare, pareze, secretii mucoase abundente, bradicardie, piele calda rosie, agitatie sau stare de inconstienta

Pentru medicul de urgenta

atropina 0,25-0,5mg s.c., se repeta la nevoie intreruperea medicatiei anticolinesterazice (Mestinon neostigmin)

3

Anestezia

1. locala/regionala

folositi anestezice locale de tip amida (lidocaina, mepivacaina, etc)

2 anestezia generala

- pentru intubatie: propofol sau etomidat, la nevoie un relaxant muscular nondepolarizant (ex rucuronium) (antidot suggamadex)
- pentru anestezie: propofol sau inhalatorie cu sevofluran sau desfluran
- pentru analgezie: remifentanyl sau fentanyl
- incercati detubarea cat mai precoce posibil
- monitorizare postoperatorie 24 ore pentru deglutitie si respiratie

ATENTIONARE

medicamente contraindicate sau cu risc de a agrava miastenia

1. Antibiotice

aminoglicozide, neomicina, fluorochinolone (ex ciprofl oxacin), macrolide (ex. eritromicina), telitromicina, tetracicline

4

2. Antireumatice si analgezice

D-penicilamina, steroizii (in afara schemei terapeutice), clorochina, chinine, metamizol

3. Medicamente cardiovasculare

antiaritmice (ex. chinidina, procaiamida), betablocante

4. Hipnotice, tranchilizante

benzodiazepine

5. Antiepileptice

gabapentin, difenilhidantoina

6. Blocante neuromusculare

succinilcolina, curara si derivati

7. Varia

procaina, chinina in remedii antigripale sau bauturi (ex apa tonica) etc.

medicamente ce contin magneziu, toxina botulinica

8. Vaccinari

de evitat vaccinurile cu germeni vii (ex: antirubeola, oreion, rujeola, varicela, febra galbena)

5

Card emis de

EuMGA

European Myasthenia Gravis Association



ASOCIATIA NATIONALA
MIASTENIA GRAVIS ROMANIA

Centrul de Informare INFO MG-RO

e-mail: asociatia.miastenia@gmail.com

website:www.miastenie.ro

Lista de "Attentionari" nu este completa si vizeaza in special acele medicamente care pot agrava miastenia in situatiile critice. Contactati un centru specializat in tratarea Miasteniei Gravis.

In serviciile de urgenta sau ICU decizia terapeutica poate fi diferita de aceste recomandari.

In afara situatiilor de urgenta, gasiti informatii pe siteul www.miastenie.ro si in materialele informative pentru pacienti de la Asociatia Nationala Miastenia Gravis.

CARD DE URGENTA/EMERGENCY CARD

MIASTENIA GRAVIS

Nume Prenume

Data nasterii

Adresa

Localitatea

Telefon/mobil

Ruda apropiata telefon

Medic curant telefon

Clinica

clasificare MGFA

anticorpi

criza MG in antecedente

tinctomie