



INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
SOS. FUNDENI, NR.258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI
TEL : 021.317.21.94 FAX : 021.318.04.44
EMAIL: SECRETARIAT@ICFUNDENI.RO



Ghid management Miastenia gravis in perioada pandemiei cu COVID-19

COVID-19 poate determina sindrom respirator acut sever (SARI).

Simptomele caracteristice sunt reprezentate de:


- **Febra**
- **Tuse**
- **Scurtarea respiratiei**
- **Diminuarea sau disparitia mirosului/gustului**
- **Diaree**

Severitatea este variabila pornind de la forme usoare pana la pneumonie, detresa respiratorie, deces.

Nu exista terapii dovedite pentru vindecare si nici vaccin care sa previna infectia.

Nu exista studii care sa demonstreze cum afecteaza COVID-19 pacientii cu miastenia gravis sau alte boli cu tratament imunosupresor. Datorita faptului ca majoritatea bolnavilor au tratament imunosupresor/immunomodulator si de asemenea, slabiciune musculara respiratorie, este probabil ca pacientii cu miastenia gravis sa aiba un risc crescut in contractarea infectiei, iar formele de boala sa fie severe.

Expertii in miastenia gravis internationali recomanda ca terapia sa fie individualizata, in colaborare cu medicul curant.



INSTITUTUL CLINIC FUNDENI

SOS. FUNDENI, NR.258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI

TEL : 021.317.21.94 FAX : 021.318.04.44

EMAIL: SECRETARIAT@ICFUNDENI.RO



INSTITUTUL CLINIC
FUNDENI

Esentiale sunt masurile preventive pentru reducerea riscului de imbolnavire:

- 1. Izolarea la domiciliu;**
- 2. Igiena riguroasa si frecventa a mainilor si a fetei;**
- 3. Dezinfectarea suprafetelor;**
- 4. Evitarea aglomeratiilor si a calatoriilor;**
- 5. Protectie si pastrarea distantei interumane;**
- 6. Stoc de provizii si de medicamente.**


Este recomandata mentinerea tratamentului cronic stabilit, intreruperea medicatiei putand duce la puseu/criza miastenica.

Medicatia utilizata in tratamentul COVID-19 poate agrava miastenia gravis si nu trebuie administrata decat la indicatia medicului si sub supraveghere medicala, cantarind riscurile si beneficiile.

Paracetamolul este recomandat si nu agraveaza miastenia. Nu sunt indicate antiinflamatoare nesteroidiene de tipul Ibuprofen/Nurofen/MIG-400/Adagin/Brufen/Advil/Amring.

Pentru pacientii infectati cu COVID-19 se recomanda:

- Pentru formele usoare: continuarea medicatiei pentru miastenie; posibil sa fie necesara cresterea dozei de cortizol.
- Pentru formele severe care necesita spitalizare se poate lua in considerare intreruperea temporara a imunosupresoarelor puternice si mentinerea celor mai slabe – azatioprina (imuran), mycophenolat mofetil (Cellcept), alaturi de tratamentul infectiei COVID-19.



INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
SOS. FUNDENI, NR.258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI
TEL : 021.317.21.94 FAX : 021.318.04.44
EMAIL: SECRETARIAT@ICFUNDENI.RO



Decizia tratamentului trebuie individualizata in functie de severitatea COVID-19 si miasteniei gravis.

Terapia utilizata in prezent pentru COVID-19 (Plaquenil, antivirale) agraveaza miastenia gravis putand declansa criza miastenica.

In cazuri severe de infectie COVID-19 se poate administra tratament sub stricta supraveghere medicala, iar dupa rezolvarea infectiei se recomanda terapia crizei miastenice (plasmafereza, imunoglobuline si imunosupresoare).

In caz de suprainfectie bacteriana sunt de evitat antibioticele din clasele:

- ❖ Fluoroquinolone
- ❖ Aminoglicozide
- ❖ Macrolide
- ❖ Tetraciline


Multa sanatate tuturor!

Data

30.03.2020

Sef sectie Neurologie II, IC Fundeni

Dr Vilciu Crisanda


Dr. CRISANDA VILCIU
MEDIC PRIMAR NEUROLOG
DOCTOR ÎN MEDICINĂ
COD 640608